

**Mouche grise des céréales,  
l'estimation du niveau de population est en cours**

En fin d'été, la mouche grise pond ses œufs sur le sol, principalement sous les betteraves. Le froment qui suit peut subir des attaques sévères. Selon les années, le niveau des pontes varie fortement. La connaissance de celui-ci permet de juger de l'opportunité d'utiliser des semences traitées avec un insecticide, seule technique de lutte fiable à ce jour.

Actuellement, la récolte et l'analyse des échantillons de sol est en cours dans nos sites de référence suivi depuis plus de dix ans. De cette façon, il est possible de déterminer par région, l'importance du risque par comparaison avec les résultats des années antérieures.

Un avertissement sera réalisé dès que possible début septembre pour vous informer de la situation de cette année.

**Jaunisse nanisante de l'orge,**

Comme par le passé, la surveillance de l'évolution des populations de pucerons virulifères sera menée. Des avertissements vous informant de la situation seront diffusés par les canaux habituels durant toutes la saison.

**Coordonnateur du C.A.D.C.O. :** ir. X. Bertel.

---

Les avertissements sont réalisés grâce au concours et au soutien  
du Ministère de la Région Wallonne - DGA - Service développement, de la Fédération Wallonne de l'Agriculture, d'Agrisemza ASBL, du Brabant wallon agro-qualité ASBL, du CARAH ASBL, du CHPTE ASBL, du CEFA ASBL, du CRAGx, des Comices wallons, de la FUSAGx, du CORDER ASBL, du Gie Greenotec, de l'OPA qualité Ciney ASBL, de Réquasud ASBL. (Visitez notre site : <http://users.swing.be/cadco>)

---