


Insecticides agréés pour lutter contre la cécidomyie équestre / céréales (1/1)

Classé par composition

Stade¹ = échelle phénologique BBCH : **(30)** Début de redressement ; **(59)** fin d'épiaison ;

DAR² : délais avant récolte ; **Zone tampon/Dérive**³ : Zone tampon en mètre et si précisé, avec technique réduisant la dérive en %

 mise à jour 3/05/2012	Nom commercial	Formulation	numéro d'agrégation	dose	nombre	stade ¹	DAR ² (Jour)	avoine	épeautre	froment	orge	seigle	triticale	zone tampon/ dérive ³	Date de fin d'utilisation		
					d'application												
Composition																	
Pyréthroïdes								par cycle ou an								si agréé, le nombre d'application maximum est précisé	
alpha-cyperméthrine 50 g/l	FASTAC	EC	8958/B	0,200 l/ha	max. 2	30-59	-	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	20 m / 90 %	-		
deltaméthrine 25 g/l	DECIS EC 2,5	EC	7172/B	0,200 l/ha	max. 2	30-59	-	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	5 m	-		
	PATRIOT		9207/B														
	SPLENDID		9627/B														
lambda-cyhalothrine 100 g/l	KARATE ZEON	CS	9231/B	0,050 l/ha	max. 2	30-59	-	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	5 m	-		
	KARIS 100 CS		10028/B														
	NINJA		9571/B														
lambda-cyhalothrine 50 g/l	LAMBDA 50 EC	EC	9749/B	0,100 l/ha	max. 2	30-59	-	-	-	max. 2	-	-	-	5 m	-		
	RAVANE 50		9647/B	0,100 l/ha	max. 2	30-59	-	max. 2	-	max. 2	max. 2	max. 2	max. 2	5 m			
tau-fluvalinate 240 g/l	MAVRIK 2F	EW	7535/B	0,150 l/ha	-	30-59	42	max. 2*	max. 2	max. 2	max. 2*	max. 2*	max. 2	10 m	-		

max.2* = uniquement agréé en culture d'hiver